

# Dermapharm AG

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder Ihre(n) Apotheker/Apothekerin.

**Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!**

## Cloderm Creme 1%

**Wirkstoff: Clotrimazol**

### Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:  
1 g Creme enthält 0,01 g Clotrimazol

Sonstige Bestandteile:

Sorbitanstearat, Polysorbat 60, Benzylalkohol, gereinigtes Wasser, Cetylpalmitat, Cetylstearylalkohol, 2-Octyl-1-dodecanol

### Darreichungsform und Inhalt:

OP mit 20 g und 50 g Creme

### Breitspektrum-Antimykotikum

#### Pharm. Unternehmer:

Dermapharm AG  
Luise-Ullrich-Straße 6  
82031 Grünwald  
Tel.: 0 89/64 18 6-0  
Fax: 0 89/64 18 6-130

#### Hersteller:

**mibe** GmbH Arzneimittel  
Münchener Straße 15  
06796 Brehna  
(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

### Anwendungsgebiete:

Pilzinfektionen der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z. B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere wie Malassezia furfur sowie Infektionen durch Corynebakterium minutissimum. Diese können sich äußern als Mykosen der Füße, Mykosen der Haut und der Hautfalten, Pityriasis versicolor, Erythrasma, oberflächliche Candidosen.

### Gegenanzeigen:

#### Wann dürfen Sie Cloderm Creme 1% nicht anwenden?

**Cloderm Creme 1%** darf nicht angewendet werden bei einer Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol.

Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol empfiehlt es sich, anstelle der Creme eine cetylstearylalkoholfreie Darreichungsform zu verwenden.

#### Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Clotrimazol sollte aus Vorsicht nicht in der Frühschwangerschaft angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

#### Welche anderen Arzneimittel beeinflusst Cloderm Creme 1%?

Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin).

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Cloderm Creme 1%** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Cloderm Creme 1%** sonst nicht richtig wirken kann.

#### Wieviel von Cloderm Creme 1% und wie oft sollten Sie Cloderm Creme 1% anwenden?

Die Creme wird 2–3-mal täglich dünn auf die erkrankten Stellen aufgetragen und eingerieben. Es genügt meist eine kleine Menge Creme (ca. 1/2 cm Stranglänge) für eine etwa handtellergroße Fläche.

### Wie lange sollten Sie Cloderm Creme 1% anwenden?

Wichtig für den Behandlungserfolg ist eine regelmäßige und ausreichend lange Anwendung der Creme. Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich; sie hängt u. a. ab vom Ausmaß und der Lokalisierung der Erkrankung. Um eine komplette Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung mit der Creme nicht nach dem Abklingen der akuten entzündlichen Symptome oder der subjektiven Beschwerden abgebrochen werden, sondern bis zu einer Behandlungsdauer von mindestens 4 Wochen fortgeführt werden.

Pityriasis versicolor heilt im allgemeinen in 1–3 Wochen und Erythrasma in 2–4 Wochen ab. Bei Fußpilz sollte – um Rückfällen vorzubeugen – und trotz rascher subjektiver Besserung ca. 2 Wochen über das Verschwinden aller Krankheitszeichen hinaus weiter behandelt werden. Nach jedem Waschen sollten die Füße gründlich abgetrocknet werden (Zehenzwischenräume).

### Nebenwirkungen:

#### Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cloderm Creme 1% auftreten?

Gelegentlich können Hautreaktionen (z. B. Brennen, Stechen) vorkommen.

Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker/Ihrer Apothekerin mit.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:


Das Verfallsdatum des Arzneimittels ist auf der Tube und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!


Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

### Stand der Information:

Oktober 2003



 <b>kroha GmbH</b> <b>D-39179 Barleben</b>	e-mail: SatzBA@Kroha.de Tel.: +49-(0)392 03-951-34
Kunde: <b>Mibe GmbH</b> bitte zu Händen: Frau Beier Ihre Ident-Nummer: GI 00072 Produktformat in mm: 148 x 210 Auftr.-Nr. letzter Korr.: A 174744 1. Korrekturabzug	Farbigkeit: 1/1-farbig schwarz  Mit freundlichen Grüßen i. A. Katrin Hänler

 <b>kroha GmbH</b> <b>D-39179 Barleben</b>	Fax: +49-(0)3 92 03-951-30 ISDN: +49-(0)3 92 03-951-39
Wir bitten Sie, diesen Korrekturabzug nach sorgfältiger Prüfung mit dem Manuskript zurückzugeben oder zurückzufaxen. Für nicht berichtigte Fehler übernehmen wir keine Verantwortung. Der Abzug ist für Druckausführung, Format und Bedruckstoff nicht maßgebend.	
<input type="checkbox"/> druckreif <input type="checkbox"/> nach Korrektur druckreif <input type="checkbox"/> nach Korrektur neuen Abzug	Datum _____ Unterschrift. _____