

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder Ihre(n) Apotheker/Apothekerin.

Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!

Delagil® Pulver

Wirkstoff: Synthetischer Gerbstoff (Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz)

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 g **Delagil® Pulver** enthalten 40 g synthetischen Gerbstoff (Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz)

Sonstige Bestandteile:

Calciumlactat-Pentahydrat, Natriumsulfat, Parfümöl

Darreichungsform und Inhalt:

5 Beutel, 10 Beutel und 40 Beutel zu 10 g sowie eine Dose zu 150 g Badezusatz

Dermatikum

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Str. 6

82031 Grünwald

Tel.: 0 89/6 41 86-0

Fax: 0 89/6 41 86-130

Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Anwendungsgebiete:

Synthetischer Gerbstoff beeinflusst aufgrund seiner adstringierenden, gerbenden und schorfbildenden Wirkungen bestimmte entzündliche, das heißt nässende und juckende Hauterkrankungen. Er lässt sich für folgende Indikationen einsetzen: Entzündliche Hauterkrankungen, insbesondere mit intertriginöser Lokalisation, z.B. Windeldermatitis.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Delagil® Pulver nicht anwenden?

Was für Vollbäder grundsätzlich gilt, trifft auch für **Delagil® Pulver** zu: Vollbäder dürfen nicht angewendet werden bei schwerer Herzmuskel- und Kreislaufschwäche, bei Bluthochdruck, fieberhaften Erkrankungen und Tuberkulose.

Bei größeren Hautverletzungen und akuten Hauterkrankungen sollte **Delagil® Pulver** nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt angewandt werden.

Delagil® Pulver sollte bei Überempfindlichkeit gegen synthetischen Gerbstoff bzw. einen anderen Bestandteil nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Delagil® Pulver kann auch während der Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Da in Gegenwart von alkalischen Seifen die Wirksamkeit von **Delagil® Pulver** beeinträchtigt wird, soll während der Anwendung von **Delagil® Pulver** nicht gleichzeitig Seife benutzt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Delagil® Pulver** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Delagil® Pulver** sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von Delagil® Pulver und wie oft sollten Sie Delagil® Pulver anwenden?

Delagil® Pulver dient zur Zubereitung von Voll-, Teil- und Sitzbädern sowie zur Bereitung von Umschlägen.

Nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Nicht für die Anwendung am Auge.

Delagil® Pulver löst sich in kaltem, lauwarmem und warmem Wasser gleichermaßen gut auf. Dennoch empfiehlt es sich, **Delagil® Pulver** in den Strahl des einlaufenden Wassers zu geben und mit der Hand anschließend zu verteilen. Für Sitzbäder können neben Dusch- und Badewannen auch von der Größe her geeignete Schüsseln benutzt werden. Für Teilbäder eignen sich Waschbecken, Duschwannen oder ausreichend große Schüsseln. Spezielle Sitzbadewannen, Arm- und Fußbadewannen sind im Fachhandel (z. B. Sanitätshäuser) erhältlich.

Soweit nicht anders verordnet:

Vollbäder (bei Erwachsenen): 30 g **Delagil® Pulver** auf ca. 150 l Wasser (= 3 Portionsbeutel oder 6 Messlöffel); Temperatur: 32 - 35 °C; Dauer: 10-15 Minuten; Häufigkeit: 2-3mal wöchentlich bis 1mal täglich.

Vollbäder (bei Kindern): 5 g **Delagil® Pulver** auf ca. 25 l Wasser (= 1/2 Portionsbeutel oder 1 Messlöffel); Temperatur: 32 - 35 °C; Dauer: 10-15 Minuten; Häufigkeit: 2-3 mal wöchentlich bis 1mal täglich.

Sitzbäder: 10 g **Delagil® Pulver** auf ca. 25 l Wasser (= 1 Portionsbeutel oder 2 Messlöffel); Temperatur: 32 - 35 °C; Dauer: 10-15 Minuten; Häufigkeit: 2-3mal wöchentlich bis 1mal täglich.

Teilbäder (Hand-, Arm-, Bein- oder Fußbäder): 5 g **Delagil® Pulver** auf ca. 10 l Wasser (= 1/2 Portionsbeutel oder 1 Messlöffel); Temperatur: 32 - 35 °C; Dauer: 10-15 Minuten; Häufigkeit: 2-3mal wöchentlich bis 1mal täglich.

Feuchte Umschläge, Waschungen und kalte Kompressen: 5 g **Delagil® Pulver** auf ca. 5 l Wasser (= 1/2 Portionsbeutel oder 1 Messlöffel); Dauer: 15-20 Minuten, Häufigkeit: 2-3mal täglich.

Bei hochakut entzündeter Haut, die bereits bei leichter Berührung mit Schmerzen und Brennen reagiert, wird eine Verringerung der **Delagil® Pulver**-Konzentration empfohlen: 2,5 g **Delagil® Pulver** auf ca. 5 l Wasser (= 1/4 Portionsbeutel, entspricht einem gestrichenen Teelöffel oder 1/2 Messlöffel).

Wie lange sollten Sie Delagil® Pulver anwenden:

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:

Wenn **Delagil® Pulver** in die Augen gelangt, sollten Sie die Augen ca. 10 Minuten unter fließendem Wasser spülen und anschließend einen Augenarzt aufsuchen. Nach versehentlicher Einnahme sollte zunächst Wasser getrunken werden. Anschließend ist der Arzt aufzusuchen, der über die weiteren Therapiemaßnahmen entscheidet.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Delagil® Pulver auftreten?

Bei der Anwendung von Gerbstoffen an der Haut können sehr selten ($\leq 0,01\%$) leichte Hautreizungen auftreten, jedoch wurden kontaktallergische Reaktionen, die sich durch Juckreiz, Rötung, Bläschen auch über das Kontaktareal hinaus (sogenannte Streureaktionen) manifestieren können, bisher nicht beschrieben. Andere Nebenerscheinungen wurden nicht festgestellt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker/Ihrer Apothekerin mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums. Die Haltbarkeit nach Anbruch der Dose beträgt 15 Wochen.

Delagil® Pulver in der Dose mit 150 g; Dose nach Entnahme der benötigten Menge wieder gut verschließen.

Stand der Information:

Februar 2006

