

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder Ihre(n) Apotheker/Apothekerin.

Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!

Nystaderm Filmtabletten

Wirkstoff: Nystatin

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Filmtablette enthält 500.000 I.E. Nystatin

Sonstige Bestandteile:

Cellactose (bestehend aus Lactose und Cellulose), Carboxymethylstärke-Natrium, Povidon, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, kationisches Polymerisat auf Methacrylatbasis, Titandioxid, Talkum, Cochenillerot A

Darreichungsform und Inhalt:

OP mit 20, 50 und 100 Filmtabletten

Hefespezifisches Antimykotikum

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Straße 6

82031 Grünwald

Tel.: 0 89/6 41 86-0

Fax: 0 89/6 41 86-1 30

Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Anwendungsgebiete:

Nystatinempfindliche Infektionen wie z.B. intestinale Candidosen und Soormykosen sowie zur Prophylaxe sekundärer Mykosen bei der Behandlung mit Antibiotika, Kortikoiden und Zytostatika.

Gegenanzeigen:

Nystaderm Filmtabletten sollten nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff. Bei auftretender Überempfindlichkeit (z.B. Brennen, Juckreiz) stellen Sie bitte die Einnahme ein und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die übliche Tagesdosis beträgt 3mal täglich 1 Filmtablette, die nach den Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einzunehmen ist. In besonderen Fällen kann unbedenklich die Dosis auf 3mal täglich 2 Filmtabletten erhöht werden.

Nebenwirkungen:

Bei normaler Dosierung ist mit Nebenwirkungen nicht zu rechnen. Selbst hohe Dosen verursachen keine Beschwerden.

Nystaderm Filmtabletten (Nystatin) sind praktisch atoxisch.

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker/Ihrer Apothekerin mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nystaderm Filmtabletten sollen nach Ablauf des auf der Durchdrückpackung und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25 °C lagern.

Hinweis:

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information:

Mai 2005

