



Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dermapharm Basissalbe

Zusammensetzung:

Citronensäure, Diammoniumhydrogencitrat, Glycerol(mono,di)oleat, Propylenglycol, Butylhydroxyanisol, dickflüssiges Paraffin, weißes Vaseline, Hartparaffin, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe, Isopropylmyristat, mittelkettige Triglyceride, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, gereinigtes Wasser, Natriumbenzoat.

Darreichungsform und Inhalt:

Packungen mit 50 g und 100 g Salbe

Zur Intervallbehandlung und Nachbehandlung von Hauterkrankungen, die vorher mit Corticosteroiden behandelt wurden.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Straße 6
82031 Grünwald
Tel.: 0 89/6 41 86-0
Fax: 0 89/6 41 86-130

Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Anwendungsgebiete:

Zur Anwendung im Rahmen einer Intervallbehandlung (Phasentherapie) bei allen Hauterkrankungen, die vorher mit Corticosteroiden behandelt wurden, z.B. bei chronisch verlaufenden Ekzemen und Dermatitisen sowie bei Psoriasis. Auch zur anschließenden Nachbehandlung.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Dermapharm Basissalbe nicht anwenden?

Dermapharm Basissalbe nicht auf offene Wunden (Rhagaden, Fissuren, frische Kratzeffekte etc.) oder in die Augen bringen.

Nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Natriumbenzoat, Propylenglykol oder Butylhydroxyanisol [2(3)-tert-Butyl-4-methoxy-phenol] anwenden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Risiken in der Schwangerschaft und während der Stillzeit sind nicht bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Aufgrund des Gehaltes an Natriumbenzoat und Butylhydroxyanisol können bei entsprechend veranlagten Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten auftreten.

Bei Neugeborenen könnte ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Gelbsucht bestehen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Dermapharm Basissalbe?

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Dermapharm Basissalbe** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Dermapharm Basissalbe** sonst nicht richtig wirken kann.

Wie und wie oft sollten Sie Dermapharm Basissalbe anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, wird **Dermapharm Basissalbe** 2- bis 3mal täglich auf die erkrankten Hautbezirke aufgetragen und leicht eingerieben.

Wie lange sollten Sie Dermapharm Basissalbe anwenden?

Im Rahmen einer Intervallbehandlung (Phasentherapie) sollte **Dermapharm Basissalbe** und das äußerlich anzuwendende Corticosteroid im Wechsel jeweils einige (ca. 4) Tage lang eingesetzt werden.

Zur Nachbehandlung kann **Dermapharm Basissalbe** auch über längere Zeit verwendet werden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Dermapharm Basissalbe auftreten?

Bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe können allergische Hautreaktionen wie Brennen und Rötung auftreten.

Aufgrund des Gehaltes an Butylhydroxyanisol können bei entsprechend veranlagten Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Tube und Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information:

Januar 2005

