

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder Ihre(n) Apotheker/Apothekerin.

Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!

Virzin Lippenherpescreme

Wirkstoff: Aciclovir

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir

Sonstige Bestandteile:

Macrogolstearat 1500, Glycerolmonostearat, Dimeticon 350, Cetylalkohol, weißes Vaseline, dickflüssiges Paraffin, Propylenglykol, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung zu 2 g Creme

Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen (Virustatikum)

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Straße 6
82031 Grünwald
Tel.: 089/6 41 86-0
Fax: 089/6 41 86-130

Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Anwendungsgebiete:

Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis).

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Virzin Lippenherpescreme nicht anwenden?

Sie dürfen **Virzin Lippenherpescreme** nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Aciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile.

Sie dürfen **Virzin Lippenherpescreme** nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle, am Auge oder in der Scheide) auftragen, da sonst mit örtlichen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Wann dürfen Sie Virzin Lippenherpescreme erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie **Virzin Lippenherpescreme** nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn die Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn darauf hinweisen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Cetylalkohol kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglykol kann Hautreizungen hervorrufen.



Virzin Lippenherpescreme 2g

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von **Virzin Lippenherpescreme** oder werden selbst in ihrer Wirkung durch **Virzin Lippenherpescreme** beeinflusst?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Virzin Lippenherpescreme** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Virzin Lippenherpescreme** sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von **Virzin Lippenherpescreme** und wie oft sollten Sie **Virzin Lippenherpescreme** anwenden?

Sie sollten die Creme 5mal täglich alle 4 Stunden auf die infizierten Hautbereiche dünn auftragen.

Wie und wann sollten Sie **Virzin Lippenherpescreme** anwenden?

Sie sollten **Virzin Lippenherpescreme** mittels eines Wattestäbchens auftragen, indem Sie dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestreichen. Beim Auftragen sollten Sie darauf achten, daß Sie nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung), sondern auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbeziehen.

Falls Sie das Auftragen mit der Hand vornehmen, sollten Sie diese vorher und nachher intensiv reinigen, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie (z. B. durch Bakterien) bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche zu verhindern.

Besonderer Hinweis:

Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte **Virzin Lippenherpescreme** bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) angewendet werden.

Wie lange sollten Sie **Virzin Lippenherpescreme** anwenden?

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Die Behandlungsdauer beträgt im allgemeinen 5 Tage. Im Einzelfall sollte eine Behandlung so lange erfolgen, bis die Bläschen verkrustet oder abgeheilt sind. Eine Behandlungsdauer von 10 Tagen sollte jedoch nicht überschritten werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:

Was ist zu beachten, wenn Sie zu wenig **Virzin Lippenherpescreme** angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort (tragen Sie die Creme nicht häufiger oder dicker auf).

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden wollen?

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, **Virzin Lippenherpescreme** ausreichend lange anzuwenden (siehe auch „Dosierungsanleitung“).

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **Virzin Lippenherpescreme** auftreten?

Nach der Anwendung von **Virzin Lippenherpescreme** kann vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten auftreten.

Rötung, Eintrocknung und Abschuppung der mit **Virzin Lippenherpescreme** behandelten Haut wurde gelegentlich beobachtet.

Selten wurde nach Anwendung von **Virzin Lippenherpescreme** vom Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Bestandteile der Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als Ursache der Hautreaktion.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, daß die oben genannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen. In solchen Fällen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker/Ihrer Apothekerin mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Tube und der Faltschachtel aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Virzin Lippenherpescreme sollte nicht über 25 °C aufbewahrt werden.

Die Haltbarkeit nach Anbruch der Tube beträgt 14 Tage.

Stand der Information:

Dezember 2004

Recycling-Papier aus 100% Altpapier. Spart Energie und Rohstoffe. Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.



Ja, ich hätte gerne mehr Informationen zum Thema Lippenherpes – bitte schicken Sie mir Ihre kostenlose Broschüre.

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____