

Datenblatt für Rezepturzwecke

Produkt	Eigenschaften	Inhaltsstoffe	Notizen
Momecutan® Fettcreme Mometasonfuroat 1 mg/g	<ul style="list-style-type: none"> • <u>pH-Wert</u>: keine Angaben • W/O-Emulsion • <u>Wassergehalt</u>: < 5 % • <u>Emulgatoren</u>: Stearylalkohol und Macrogolcetylstearylether (Gemisch) • <u>Konservierung</u>: entfällt • <u>Haltbarkeit nach Anbruch</u>: 6 Monate 	weißes Vaseline gebleichtes Wachs Propylenglycolmonopalmitostearat Stearylalkohol Macrogolcetylstearylether Titandioxid (E 171) gereinigtes Wasser 2-Methylpentan-2,4-diol Stärke[hydrogen-2-(oct-1-en-1-yl)butandioat]-Aluminiumsalz Phosphorsäure 10 % (in geringen Mengen zur Einstellung des pH-Wertes)	
Momecutan® Lösung Mometasonfuroat 1 mg/g	<ul style="list-style-type: none"> • <u>pH-Wert</u>: 4,0 –5,0 • wässrig-alkoholische Lösung • <u>Wassergehalt</u>: 25 – 35 % • <u>relative Dichte</u>: 0,92 – 0,95 g/ml • <u>Konservierung</u>: entfällt • <u>Emulgator</u>: entfällt • <u>Haltbarkeit nach Anbruch</u>: 6 Monate 	Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat Hyprolose Propylenglycol 2-Propanol gereinigtes Wasser Phosphorsäure 10 % (in geringen Mengen zur Einstellung des pH-Wertes)	
Momecutan® Salbe Mometasonfuroat 1 mg/g	<ul style="list-style-type: none"> • kein messbarer pH-Wert • <u>Emulgator</u>: entfällt • <u>Konservierung</u>: entfällt • <u>Haltbarkeit nach Anbruch</u>: 6 Monate 	weißes Vaseline gebleichtes Wachs Propylenglycolmonopalmitostearat 2-Methylpentan-2,4-diol Phosphorsäure 10 % (in geringen Mengen zur Einstellung des pH-Wertes)	