

Chinosol[®] Tabletten 0,5 g

Tabletten zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut
Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Chinosol Tabletten 0,5 g und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Chinosol Tabletten 0,5 g beachten?
3. Wie sind Chinosol Tabletten 0,5 g anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Chinosol Tabletten 0,5 g aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND CHINOSOL TABLETTE 0,5 G UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Chinosol Tabletten 0,5 g sind ein keimminderndes Mittel zur Anwendung auf der Haut.

Chinosol Tabletten 0,5 g werden angewendet zur äußerlichen Anwendung zur Keimminderung auf der Haut. Zum Bereiten von Bädern, Spülungen und Umschlägen.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON CHINOSOL TABLETTE 0,5 G BEACHTEN?

Die zubereitete Lösung färbt die Haut, Wäsche und andere Gegenstände schwach gelb. Frische Flecken lassen sich aus der Wäsche durch einfaches Waschen leicht entfernen. Nach Eintrocknung kann die Fleckentfernung mit verdünnter Essigsäure versucht werden. Bei empfindlichen Textilien sollte zunächst an einer geeigneten Stelle geprüft werden, wie das Material die Behandlung verträgt.

Chinosol Tabletten 0,5 g dürfen nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat, anderen Chinolinen oder einem der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Chinosol Tabletten 0,5 g anwenden.

Anwendung von Chinosol Tabletten 0,5 g zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel annehmen/angewenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie dürfen Chinosol Tabletten 0,5 g nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen, da über die Sicherheit einer Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit keine Daten vorliegen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. WIE SIND CHINOSOL TABLETTE 0,5 G ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Art der Anwendung

Zur äußerlichen Anwendung nach Lösen der Tablette in Wasser. Zum Bereiten von Bädern, feuchten Verbänden, Umschlägen und Spülungen.

Die Tablette löst sich nicht rückstandsfrei auf. Die zubereitete Lösung kann angewendet werden, sobald die Tablette vollständig zerfallen ist (kann einige Minuten dauern).

Soweit möglich, ist warmes Wasser zu verwenden.

Bäder:

1 Tablette zu 0,5 g auf 1½ - 2 Liter Wasser

Feuchte Verbände, Umschläge und Spülungen:

1 Tablette zu 0,5 g auf 1 - 1½ Liter Wasser

Hinweis:

Die Zerfallszeit der Tablette kann beschleunigt werden, indem warmes bis heißes, aber nicht kochendes Wasser (ca. 50 – 80 °C) verwendet wird. Wir empfehlen in diesem Fall, einen Teil der benötigten Wassermenge zu erhitzen und zum Lösen der Tablette zu verwenden und diese Lösung mit der entsprechenden Restmenge an kaltem oder lauwarmem Wasser zu verdünnen, so dass die fertige Lösung sofort die für die vorgesehene Anwendung gewünschte Temperatur hat. Erst wenn die fertige Lösung nicht mehr als 40 °C warm ist, anwenden.

Dauer der Anwendung

Wenden Sie Chinosol Tabletten 0,5 g ohne ärztlichen Rat nicht länger als 14 Tage an.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Chinosol Tabletten 0,5 g zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Chinosol Tabletten 0,5 g angewendet haben, als Sie sollten Sie können die Behandlung mit der angegebenen Dosierung fortsetzen. Bei einer kurzfristigen Überdosierung sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Wenn Sie die Anwendung von Chinosol Tabletten 0,5 g vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Chinosol Tabletten 0,5 g abbrechen

Sie könnten den Behandlungserfolg gefährden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung mit Chinosol Tabletten 0,5 g abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Häufig kommt es bei der Anwendung zu örtlichen Hautirritationen (Kontaktexzemen).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND CHINOSOL TABLETTEN 0,5 G AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf Umkarton und Behältnis nach »Verwendbar bis« angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Zubereitung:

Die chemische und physikalische Stabilität der gebrauchsfertigen Zubereitung wurde bei Raumtemperatur über 28 Tage nachgewiesen. Aus mikrobiologischer Sicht empfehlen wir Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit, die gebrauchsfertige Zubereitung dennoch möglichst sofort (innerhalb eines Tages) zu verwenden.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Chinosol Tabletten 0,5 g enthalten:

Der Wirkstoff ist Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat.

1 Tablette enthält 476 mg Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Talkum, Macrogol 6000, hochdisperses Siliciumdioxid.

Wie Chinosol Tabletten 0,5 g aussehen und Inhalt der Packung

Chinosol Tabletten 0,5 g sind gelbe Tabletten und sind in Packungen zu 5, 10, 20 und 50 Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Dermapharm AG

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Tel.: 089 / 641 86-0

Fax: 089 / 641 86-130

E-Mail: service@dermapharm.de

Hersteller

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2015.

